



ประสบการณ์จากการถูกคุมขังของผู้ใช้ยาด้วยวิธีการฉีดในประเทศไทย

เหตุผลและวิธีการ

ในหลายประเทศรวมทั้งประเทศไทย แนวทางหลักในการแก้ปัญหาคาใช้ยามักเน้นไปที่การจับกุมคุมขัง โชคร้ายที่มีหลักฐานเป็นที่ประจักษ์ว่า การคุมขังส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้นักใช้ยาด้วยวิธีการฉีด ทั้งในแง่การรับเชื้อเอชไอวีและการเสียชีวิตจากการใช้ยาเกินขนาด ในปี 2551 คณะนักวิจัยได้ทำงานร่วมกันในโครงการวิจัยชุมชนมิตรสัมพันธ์เพื่อสำรวจประสบการณ์ระหว่างถูกคุมขังของผู้ใช้ยาด้วยวิธีการฉีดในเขตกรุงเทพฯ

ข้อมูล

เกือบร้อยละ 30 ของผู้ใช้นักใช้ยาที่มีประวัติถูกคุมขังมาก่อนระบุว่า ยังคงใช้ยาระหว่างอยู่ในเรือนจำ

ผลการศึกษา

ร้อยละ 78 ของผู้ให้ข้อมูล 252 คนระบุว่าเคยถูกคุมขังมาก่อน เทียบกับผู้ที่ไม่เคยมีประวัติถูกคุมขังมาก่อน ผู้ที่เคยอยู่ถูกคุมขังมักระบุว่า เคยแลกเปลี่ยนเข็มฉีดยาร่วมกันและเคยถูกบังคับบำบัดยา เกือบร้อยละ 30 ของผู้นักใช้ยาที่มีประวัติถูกคุมขังมาก่อนระบุว่า ยังคงใช้ยาระหว่างอยู่ในเรือนจำ และร้อยละ 81 ของคนกลุ่มนี้ยังใช้เข็มฉีดยาร่วมกันระหว่างถูกคุมขังด้วย

ผลสรุปและข้อเสนอแนะ

ผลการวิจัยเน้นให้เห็นว่า นโยบายยาเสพติดที่ให้ความสำคัญต่อการบังคับใช้กฎหมายส่งเสริมให้เกิดการระบาดของเชื้อเอชไอวีในประเทศไทยได้ อย่างไรก็ตามประเทศไทยควรดำเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อให้มีโครงการแลกเปลี่ยนเข็มฉีดยาในเรือนจำ รวมทั้งมีการนำแนวทางแก้ปัญหามาให้ความช่วยเหลือด้านสุขภาพเพื่อแก้ไขอันตรายที่เกิดจากการใช้ยาผิด

ผู้แปล พิกพ อุคมอิทธิพงษ์

Hayashi K, Milloy MJ, Fairbairn N, Kaplan K, Suwannawong P, Lai C, Wood E, Kerr T. Incarceration experiences among a community-recruited sample of injection drug users in Bangkok, Thailand. *BMC Public Health*, 2009; 9: 492.

